

## RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

### LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

**PrEbglyss<sup>MC</sup>**

#### **Injection de lébrikizumab**

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre **Ebglyss** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet d'**Ebglyss**.

#### **Pourquoi Ebglyss est-il utilisé?**

- Ebglyss est un médicament d'ordonnance utilisé pour traiter les adultes ainsi que les adolescents âgés de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg qui sont atteints de dermatite atopique (eczéma) modérée ou sévère et dont la maladie n'est pas adéquatement maîtrisée par les traitements d'ordonnance appliqués sur la peau (topiques) ou qui ne peuvent pas utiliser de traitement topique. Ebglyss peut être utilisé avec ou sans corticostéroïdes topiques.
- On ignore si Ebglyss est sûr et efficace chez les adolescents présentant une dermatite atopique qui pèsent moins 40 kg ou chez les enfants de moins de 12 ans.

#### **Comment Ebglyss agit-il?**

Ebglyss contient comme substance active le lébrikizumab.

Le lébrikizumab est un anticorps monoclonal. Les anticorps monoclonaux sont un type spécifique de protéines qui reconnaissent d'autres protéines bien précises dans le corps humain et s'y fixent.

Ebglyss bloque une protéine appelée IL-13, laquelle est présente à des taux plus élevés chez les personnes atteintes de dermatite atopique. En bloquant l'IL-13, Ebglyss peut réduire l'inflammation, améliorer l'apparence de la peau et atténuer les démangeaisons, la rougeur et la desquamation.

#### **Quels sont les ingrédients dans Ebglyss?**

Ingrédient médicinal : lébrikizumab

Ingrédients non médicinaux : acide acétique glacial, histidine, polysorbate 20, sucrose et eau pour injection.

#### **Ebglyss est disponible sous les formes posologiques suivantes :**

- stylo-injecteur prérempli à usage unique de 250 mg/2 mL;
- seringue préremplie à usage unique de 250 mg/2 mL avec protecteur d'aiguille;
- le stylo-injecteur prérempli et la seringue préremplie avec protecteur d'aiguille Ebglyss

ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel.

**Ne pas utiliser Ebglyss si :**

vous êtes allergique au lébrikizumab ou à tout autre ingrédient de ce médicament.

**Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Ebglyss, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment dans les cas suivants :**

- vous avez des problèmes aux yeux (par exemple, démangeaisons, rougeur);
- vous avez une infection causée par des parasites intestinaux (helminthes);
- vous avez prévu de vous faire vacciner. Vous ne devez pas recevoir de « vaccin vivant » si vous êtes traité par Ebglyss;
- vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ignore si Ebglyss est nocif pour un enfant à naître;
- vous allaitez ou prévoyez allaiter. On ignore si Ebglyss est excrété dans le lait maternel.

**Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.**

**Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec Ebglyss :**

- Informez votre professionnel de la santé si vous avez récemment reçu ou allez recevoir un vaccin. Vous ne devez pas recevoir de « vaccin vivant » pendant que vous prenez Ebglyss.

**Comment prendre Ebglyss :**

- **Consultez les directives d'utilisation, fournies avec les présents renseignements sur le médicament destinés aux patients, qui présentent la façon de préparer et d'injecter Ebglyss et la façon d'entreposer et de jeter (mettre au rebut) les stylos-injecteurs préremplis et les seringues préremplies Ebglyss utilisés.**
- Utilisez Ebglyss exactement comme le prescrit votre professionnel de la santé.
- Ebglyss est disponible sous forme de stylo-injecteur prérempli à usage unique ou de seringue préremplie à usage unique avec protecteur d'aiguille.
- Ebglyss s'administre par injection sous la peau (injection sous-cutanée).
- Si votre professionnel de la santé détermine que vous ou un soignant pouvez vous administrer Ebglyss à la maison, vous devrez suivre une formation sur la façon appropriée de préparer et d'injecter Ebglyss.
- Ne tentez pas de vous injecter Ebglyss avant que votre professionnel de la santé ne vous ait expliqué comment le faire correctement. Chez les personnes âgées de moins de 18 ans, Ebglyss doit être administré par un adulte.
- Injectez Ebglyss dans votre ventre (abdomen) ou votre cuisse, ou demandez à un soignant d'injecter Ebglyss dans la partie supérieure arrière de votre bras.
- Votre professionnel de la santé peut prescrire d'autres médicaments à utiliser avec Ebglyss. Utilisez les autres médicaments prescrits en suivant à la lettre les directives de votre professionnel de la santé.
- Si vous avez des questions sur le moment auquel vous devriez utiliser Ebglyss, posez-les à votre professionnel de la santé.

- N'utilisez pas ce médicament s'il semble trouble ou s'il fuit du dispositif d'administration.

### **Dose habituelle :**

Chaque stylo-injecteur prérempli et chaque seringue préremplie avec protecteur d'aiguille contient 250 mg d'Ebglyss à injecter sous la peau (sous-cutanée).

- La dose initiale d'Ebglyss est de 500 mg (deux injections) injectés par voie sous-cutanée à la semaine 0 et à la semaine 2, puis de 250 mg (une injection) toutes les deux semaines jusqu'à la semaine 16.
- La dose d'entretien est de 250 mg toutes les quatre semaines à compter de la semaine 16.

### **Surdosage :**

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop d'Ebglyss, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

### **Dose oubliée :**

Si vous oubliez une dose, injectez la dose oubliée dès que possible, puis continuez à prendre les doses selon le calendrier prévu, à partir du jour d'injection suivant.

### **Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Ebglyss?**

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez Ebglyss. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires les plus courants d'Ebglyss sont les suivants :

- inflammation des yeux et des paupières, y compris rougeur, enflure, démangeaisons et sécheresse;
- réactions au point d'injection;
- zona (herpès zoster);
- nombre élevé de certains globules blancs.

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

### **Déclaration des effets secondaires**

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en :

- consultant le site Web sur la signalisation des effets secondaires (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment déclarer un effet secondaire en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

### **Entreposage :**

Conserver au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C, et laisser dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.

Au besoin, Ebglyss peut être conservé dans l'emballage d'origine à température ambiante maximale de 30 °C jusqu'à 7 jours. Ebglyss doit être jeté s'il n'est pas utilisé après 7 jours à température ambiante.

Ne pas congeler. Ne pas l'utiliser s'il a déjà été congelé.

Ne pas agiter.

Après utilisation, le stylo-injecteur prérempli à usage unique ou la seringue préremplie à usage unique avec protecteur d'aiguille Ebglyss doivent être jetés dans un contenant résistant aux perforations.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Pour en savoir davantage au sujet d'Ebglyss :**

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament destinés au patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant ([www.lilly.ca](http://www.lilly.ca)), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-800-545-5972.

Ebglyss est une marque déposée détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou sociétés affiliées.

Le présent dépliant a été rédigé par Eli Lilly Canada Inc.

Dernière révision : 24 juin 2024

EBG-0001-CA-PMI-20240624