

MODE D'EMPLOI

PrMOUNJARO®

tirzépatide injectable

fiole à dose unique pour administration sous-cutanée

Fiole à dose unique à 2,5 mg/0,5 mL

Fiole à dose unique à 5 mg/0,5 mL

Fiole à dose unique à 7,5 mg/0,5 mL

Fiole à dose unique à 10 mg/0,5 mL

Fiole à dose unique à 12,5 mg/0,5 mL

Fiole à dose unique à 15 mg/0,5 mL

Renseignements importants à connaître avant de procéder à l'injection de MOUNJARO


Lisez attentivement ce « **MODE D'EMPLOI** » et les renseignements sur le médicament pour le patient avant de prendre MOUNJARO et lors de chaque renouvellement d'ordonnance. Il pourrait y avoir de l'information nouvelle. Cette information n'est toutefois pas destinée à remplacer les directives de votre professionnel de la santé en ce qui concerne votre maladie ou votre traitement.

Demandez à votre professionnel de la santé comment injecter MOUNJARO de la bonne façon.

- MOUNJARO est présenté dans une fiole à dose unique.
- MOUNJARO est utilisé une fois par semaine.
- Le médicament doit être injecté sous la peau (par injection sous-cutanée) seulement.
- Vous ou une autre personne pouvez l'injecter dans votre ventre (abdomen) ou votre cuisse.
- Une autre personne peut l'injecter dans la partie supérieure arrière de votre bras.

Avant d'utiliser MOUNJARO, rassemblez le matériel nécessaire à l'injection :



- 1 fiole à dose unique MOUNJARO
- 1 seringue et 1 aiguille (selon les directives de votre professionnel de la santé).
 - **Ne réutilisez pas** les aiguilles ni les seringues. Utilisez toujours une seringue et une aiguille neuves pour chaque injection, afin de prévenir les infections et l'obstruction des aiguilles.
 - **Ne partagez pas** vos aiguilles ni vos seringues avec d'autres personnes. Vous pourriez transmettre ou contracter une infection grave.
- 1 tampon imbibé d'alcool
- compresse de gaze
- 1 contenant pour objets pointus et tranchants pour jeter les aiguilles et les seringues usagées. Consultez la section « **Mise au rebut des aiguilles et des seringues usagées** » à la fin de ce mode d'emploi.












L'aiguille et la seringue sont présentées à titre d'illustration seulement. L'aspect de l'aiguille ou de la seringue recommandée par votre part de professionnel de la santé peut être différent de celles présentées dans ce MODE D'EMPLOI.

Préparation de l'injection de MOUNJARO

- **Retirez la fiole** du réfrigérateur.
- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon.
- **Vérifiez l'étiquette de la fiole** pour vous assurer que vous avez la bonne dose et le bon médicament, et que la date d'expiration n'est pas dépassée.
- Veillez à ce que le médicament qui se trouve dans la fiole soit incolore ou légèrement jaune.
- **N'utilisez pas** le médicament s'il est congelé, s'il est trouble ou s'il contient des particules.




<p>Étape 1 : Retirez le capuchon protecteur en plastique, mais n'enlevez pas le bouchon de caoutchouc.</p>	
<p>Étape 2 : Nettoyez le bouchon de caoutchouc avec un tampon d'alcool.</p>	
<p>Étape 3 : Retirez l'emballage de la seringue.</p>	

<p>Étape 4 :</p> <p>Retirez l'emballage de l'aiguille. La seringue que votre professionnel de la santé a recommandée peut être munie d'une aiguille préfixée. Si c'est le cas, passer à l'étape 6.</p>	
<p>Étape 5 :</p> <p>Alignez l'aiguille et maintenez-la bien droite pendant que vous la fixez sur la seringue. Placez l'aiguille au bout de la seringue et vissez-la en poussant jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée, conformément aux instructions de votre professionnel de la santé.</p>	
<p>Étape 6 :</p> <p>Retirez le protecteur de l'aiguille en le tirant tout droit. Prenez soin que l'aiguille n'entre en contact avec aucune autre surface.</p>	
<p>Étape 7 :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pointez l'aiguille de la seringue vers le haut. B. Appuyez sur le piston jusqu'à que l'extrémité atteigne la marque indiquant qu'au moins 0,5 mL d'air a été aspiré dans la seringue. 	
<p>Étape 8 :</p> <p>Transpercez le bouchon de caoutchouc de la fiole avec l'aiguille.</p>	
<p>Étape 9 :</p> <p>Poussez le piston jusqu'au fond. Cela fait entrer de l'air dans la fiole, ce qui facilite le retrait de la solution.</p>	

<p>Étape 10 :</p> <p>A. Inversez la fiole et la seringue.</p> <p>B. En veillant à ce que la pointe de l'aiguille se trouve dans le médicament, tirez lentement le piston vers le bas jusqu'à ce que l'extrémité dépasse la marque indiquant 0,5 mL.</p> <p>C. S'il y a des bulles d'air, tapotez la seringue jusqu'à ce que les bulles remontent à la surface.</p>	
<p>Étape 11 :</p> <p>Poussez lentement le piston jusqu'à ce que l'extrémité atteigne la ligne indiquant 0,5 mL. À ce stade, il ne doit plus y avoir d'air dans la seringue.</p>	
<p>Étape 12 :</p> <p>Retirez la seringue du bouchon de caoutchouc de la fiole. Veillez à retirer la seringue en la tenant bien droite afin d'éviter de courber l'aiguille.</p> <p>Assurez-vous que l'aiguille n'entre en contact avec aucune autre surface.</p>	

Injection de MOUNJARO

- Injectez-vous exactement comme votre professionnel de la santé vous l'a montré.
- Il faut veiller à alterner les points d'injection d'une fois à l'autre. Vous pouvez utiliser la même région du corps, mais veillez à choisir un point d'injection différent. Le fait de changer de point d'injection réduit le risque de présenter une des affections suivantes au point d'injection :
 - lipodystrophie (peau épaissie ou creuse)
 - amylose cutanée localisée (bosses sur la peau).
- **Ne pas** injecter le médicament aux endroits où la peau est creuse, est épaisse ou présente des bosses.
- Vous **ne devez pas** injecter le médicament aux endroits où la peau est sensible, meurtrie, sèche ou durcie, ni sur des cicatrices ou des lésions cutanées.
- **Ne pas** mélanger MOUNJARO avec d'autres médicaments.
- **Ne pas** injecter MOUNJARO au même point d'injection que celui utilisé pour d'autres médicaments.

<p>Étape 13 :</p> <p>Choisissez le point d'injection. Préparez le point d'injection comme vous l'a enseigné votre professionnel de la santé. MOUNJARO est injecté sous la peau (injection sous-cutanée).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous ou une autre personne pouvez injecter le médicament dans votre ventre (abdomen) ou votre cuisse. <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une autre personne peut l'injecter dans la partie supérieure arrière de votre bras. 	 <p>The diagram consists of two line drawings. The top drawing shows a human torso from the front, with a shaded circular area on the abdomen and two shaded oval areas on the upper back of the arms. Below this drawing is the word 'OU'. The bottom drawing shows a human torso from the back, with two shaded oval areas on the upper back of the arms.</p>
<p>Étape 14 :</p> <p>Insérez l'aiguille dans votre peau.</p>	 <p>The diagram shows a close-up of a hand holding a syringe. An arrow points to the right, indicating the direction of the needle's insertion into the skin.</p>
<p>Étape 15 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le piston pour injecter la dose complète. L'extrémité du piston doit se trouver au fond de la seringue. • L'aiguille doit rester dans la peau pendant au moins 5 secondes pour vous assurer d'avoir injecté tout le médicament. 	 <p>The diagram shows a close-up of a hand holding a syringe. An arrow points to the left, indicating the direction of the plunger's movement to inject the medication.</p>
<p>Étape 16 :</p> <p>Retirez l'aiguille de votre peau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous voyez du sang après avoir retiré l'aiguille de votre peau, appliquez une pression au point d'injection avec une gaze ou un tampon imbibé d'alcool. Ne frottez pas le point d'injection. • Ne remettez pas le capuchon sur l'aiguille. Remettre le capuchon sur l'aiguille peut entraîner une piqûre accidentelle. 	 <p>The diagram shows a close-up of a hand holding a syringe. An arrow points to the left, indicating the direction of the needle's removal from the skin.</p>

Mise au rebut des aiguilles et des seringues usagées

- Mettez les aiguilles et les seringues usagées dans un contenant pour objets pointus et tranchants immédiatement après leur utilisation. **Ne jetez pas** les aiguilles et les seringues aux ordures ménagères.

- Si vous n'avez pas de contenant pour objets pointus et tranchants, vous pouvez utiliser un contenant ménager qui :
 - est fait de plastique résistant;
 - peut être refermé au moyen d'un couvercle bien ajusté, qui résiste aux perforations et retient les objets pointus à l'intérieur;
 - peut rester stable et en position verticale quand vous l'utilisez;
 - est résistant aux fuites;
 - est muni d'une étiquette indiquant qu'il contient des déchets dangereux.
- Lorsque votre contenant pour objets pointus et tranchants est presque plein, vous devez suivre les directives de votre localité pour vous en débarrasser correctement. Il est possible qu'il existe des règlements locaux concernant la mise au rebut des aiguilles et des seringues usagées.
- **Ne recyclez pas** votre contenant pour objets pointus et tranchants une fois qu'il a été utilisé.

Conservation de MOUNJARO

- Conservez les fioles non ouvertes au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C.
- Vous pouvez conserver les fioles non ouvertes à une température ambiante inférieure à 30 °C pendant un total de 21 jours.
- **NE PAS** congeler. N'utilisez **pas** la fiole de MOUNJARO qui aurait été congelée.
- Conservez la fiole dans sa boîte d'origine pour la protéger de la lumière.
- Jetez toutes les fioles ouvertes après leur utilisation, même si elles ne sont pas vides.

Gardez vos fioles de MOUNJARO, seringues, aiguilles et tous vos médicaments hors de la vue et de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements

- Pour toute question ou tout problème relativement à votre fiole de MOUNJARO, communiquez avec Lilly au 1-888-545-5972 ou avec votre professionnel de la santé pour obtenir de l'aide.
- Pour en savoir plus sur la fiole de MOUNJARO, visitez notre site Web au www.lilly.ca.

Fabricant

Eli Lilly Canada Inc.
C.P. C.P. 73
Toronto (Ontario)
M5X 1B1

MOUNJARO est une marque déposée détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou ses sociétés affiliées.

© 2023, Eli Lilly and Company. Tous droits réservés.

Date d'approbation du mode d'emploi : 01 NOV 2023

MON-VL-0002-IFU-20231101