


DIRECTIVES D'UTILISATION
PrOMVOH^{MC}
mirikizumab injectable
pour administration sous-cutanée
Seringue préremplie



Les présentes Directives d'utilisation vous expliquent comment vous injecter OMVOH.

Pour injection sous-cutanée seulement.

Avant d'utiliser les seringues préremplies OMVOH, lisez attentivement toutes les directives et suivez-les étape par étape. Deux injections sont nécessaires pour obtenir une dose complète.

Renseignements importants à connaître avant de procéder à l'injection d'OMVOH


- Votre professionnel de la santé devrait vous montrer comment préparer et vous injecter OMVOH à l'aide de la seringue préremplie. **Ne vous injectez pas** OMVOH et ne l'injectez pas à une autre personne avant d'avoir reçu une formation appropriée.
- Conservez les présentes Directives d'utilisation afin de pouvoir les consulter ultérieurement au besoin.
- Deux injections d'OMVOH sont requises pour obtenir une dose complète.
- Vous devrez effectuer deux injections (administrer le contenu des deux seringues préremplies OMVOH), immédiatement l'une après l'autre.
- Chaque seringue préremplie OMVOH est destinée à un **usage unique**. **Ne partagez pas et ne réutilisez pas** vos seringues préremplies OMVOH. Vous pourriez transmettre ou contracter une infection.
- Votre professionnel de la santé pourra vous aider à déterminer à quel endroit du corps injecter le médicament. Vous pouvez également consulter la section **Choisissez le point d'injection** des présentes directives pour choisir l'endroit de votre corps qui vous convient le mieux.
- Si vous avez un trouble de la vue, **n'utilisez pas** les seringues préremplies OMVOH sans l'assistance d'un aidant.
- Consultez la section **Entreposage des seringues préremplies OMVOH** pour obtenir des renseignements importants à cet égard.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Avant d'utiliser les seringues préremplies OMVOH, lisez attentivement toutes les directives et suivez-les étape par étape.

Composantes de la seringue préremplie OMVOH

Haut



Base

100 mg/mL + 100 mg/mL = 1 dose complète

IMPORTANT :

- Deux injections d'OMVOH sont requises pour obtenir une dose complète.
- Vous devrez effectuer deux injections (administrer le contenu des deux seringues préremplies OMVOH), immédiatement l'une après l'autre.

Préparation de l'injection d'OMVOH

Sortez les seringues préremplies du réfrigérateur

Sortez deux seringues préremplies OMVOH du réfrigérateur.

Laissez les capuchons en place jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.

Laissez reposer les seringues préremplies à la température ambiante pendant 30 minutes avant l'injection.

Ne réchauffez pas les seringues préremplies au micro-ondes, **ne faites pas** couler de l'eau chaude dessus et **ne les placez pas** sous la lumière directe du soleil.

N'utilisez pas les seringues préremplies si le médicament est congelé.


N'agitez pas les seringues préremplies.

Rassemblez le matériel

Matériel :

- 2 tampons imbibés d'alcool
- 2 boules d'ouate ou compresses de gaze
- 1 contenant pour objets pointus et tranchants (voir **Mise au rebut des seringues préremplies OMVOH**)

Inspectez les seringues préremplies et le médicament



Assurez-vous d'avoir le bon médicament. La solution à l'intérieur doit être transparente. Elle peut être incolore à jaunâtre.

N'utilisez pas les seringues préremplies et mettez-les au rebut (jetez-les) en suivant les consignes de votre professionnel de la santé ou de votre pharmacien :

- si elles semblent endommagées;
- si le médicament est trouble, a changé de couleur ou contient des particules;
- si la date de péremption imprimée sur l'étiquette est passée;
- si le médicament est congelé.


Préparez-vous pour l'injection

Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau avant de vous injecter OMVOH.

Choisissez le point d'injection

Votre professionnel de la santé peut vous aider à choisir le point d'injection qui vous convient le mieux.

- **Vous** pouvez vous injecter le médicament dans l'abdomen (ventre), **ou une autre personne** peut le faire pour vous. Le médicament **ne doit pas** être injecté à moins de 5 cm (2 pouces) du nombril.
- **Vous** pouvez vous injecter le médicament sur le devant de la cuisse, **ou une autre personne** peut le faire pour vous. Cette zone doit se situer à au moins 5 cm (2 pouces) au-dessus du genou et 5 cm (2 pouces) en dessous de l'aîne.
- **Une autre personne** peut vous injecter le médicament dans la partie supérieure arrière du bras.




- **N'injectez pas** le médicament exactement au même endroit d'une fois à l'autre. Par exemple, si vous avez fait la première injection dans l'abdomen, vous pouvez faire la seconde injection, pour avoir la dose complète, à un autre endroit de l'abdomen.
- **Ne faites pas** d'injection sur une partie du corps où la peau est sensible, rouge, indurée ou couverte d'une ecchymose (un bleu).

Nettoyez la peau au point d'injection avec un tampon imbibé d'alcool et laissez-la sécher avant d'injecter le médicament.

Au moment d'injecter OMVOH


1 Retirez le capuchon



- **Laissez le capuchon en place jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.**
- Retirez le capuchon de l'aiguille et jetez-le dans la poubelle.
- **Ne remettez pas** le capuchon de l'aiguille sur la seringue. Vous risqueriez d'endommager l'aiguille ou de vous piquer accidentellement.
- **Ne touchez pas** l'aiguille.

2 Insérez l'aiguille



- Pincez doucement la peau pour former un pli au point d'injection.



- Insérez l'aiguille en formant un angle de 45 degrés avec la peau.

3 Injectez le médicament

- À l'aide du pouce, enfoncez le piston lentement et complètement pour injecter tout le contenu de la seringue.
- Le piston gris de la seringue doit être poussé jusqu'à ce qu'il atteigne l'aiguille, au fond de la seringue.
- Lorsque l'injection est terminée, vous devez voir la tige du piston bleu dans le corps de la seringue, comme le montre l'illustration.
- Retirez l'aiguille et relâchez doucement la peau.
- En cas de saignement au point d'injection, exercez une pression avec une boule d'ouate ou une compresse de gaze.
- **Ne frottez pas** le point d'injection, pour ne pas causer une ecchymose (un bleu).
- **Ne remettez pas** le capuchon de l'aiguille sur la seringue préremplie.



Deux injections sont nécessaires pour obtenir une dose complète. Effectuez deux injections (administrer le contenu de chacune des seringues préremplies), immédiatement l'une après l'autre.

Mise au rebut des seringues préremplies OMVOH

Jetez les seringues préremplies usagées.

- Immédiatement après l'utilisation, mettez les seringues préremplies OMVOH dans un contenant pour objets pointus et tranchants. **Ne jetez pas** les seringues préremplies OMVOH dans vos ordures ménagères.



- Si vous n'avez pas de contenant pour objets pointus et tranchants, vous pouvez utiliser un contenant ménager qui :
 - est fait de plastique résistant;

- peut être refermé au moyen d'un couvercle étanche, résistant aux perforations et qui empêche les objets pointus de sortir;
 - reste droit et stable pendant l'utilisation;
 - résiste aux fuites; et
 - est muni d'une étiquette indiquant qu'il contient des déchets dangereux.
- Lorsque votre contenant pour objets pointus et tranchants est presque plein, vous devez suivre les directives de votre localité pour vous en débarrasser correctement. Il existe peut-être des lois locales sur la mise au rebut des aiguilles et des seringues.
- **Ne recyclez pas** votre contenant pour objets pointus et tranchants une fois qu'il a été utilisé.

Questions fréquemment posées

Q. Que dois-je faire si je laisse reposer ma seringue préremplie OMVOH plus de 30 minutes avant de procéder à l'injection?

R. Votre seringue préremplie peut rester à une température ambiante maximale de 30 °C jusqu'à 2 semaines.

Q. Que faire si je vois des bulles d'air dans ma seringue préremplie OMVOH?

R. La présence de bulles d'air dans la seringue préremplie est normale. Elles ne vous causeront pas de tort et ne modifieront pas la dose injectée.

Q. Que faire s'il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille lorsque j'enlève le capuchon de l'aiguille?

R. Il est normal de voir une goutte de liquide au bout de l'aiguille. Elle est sans danger et ne modifiera pas la dose injectée.

Q. Que dois-je faire si je n'arrive pas à enfoncer le piston?

R. Si le piston est coincé ou endommagé :

- **Cessez d'utiliser** la seringue
- Retirez l'aiguille de votre peau
- Jetez la seringue et prenez-en une nouvelle

Q. Que faire s'il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l'injection?

R. C'est normal. Exercez une pression au point d'injection avec une boule d'ouate ou une compresse. **Ne frottez pas** le point d'injection.

Q. Comment puis-je savoir que l'injection est terminée?

R. Une fois l'injection terminée :

- la tige du piston bleu sera visible dans le corps de la seringue.
- le piston gris de la seringue doit être poussé jusqu'à ce qu'il atteigne l'aiguille, au fond de la seringue.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de la seringue préremplie OMVOH :

- Appelez votre professionnel de la santé ou
- Appelez-nous au 1-888-545-5972
- Consultez le site Web www.lilly.ca

Entreposage des seringues préremplies OMVOH

- Conservez vos seringues préremplies au réfrigérateur à une température située entre 2 et 8 °C.
- Vous pouvez conserver vos seringues préremplies à la température ambiante pendant une période maximale de 2 semaines. OMVOH **ne peut être entreposé** à des températures dépassant 30 °C et il doit être jeté s'il n'est pas utilisé au cours de la période de 2 semaines où il est laissé à la température ambiante.
- **Ne congelez pas** vos seringues préremplies.

- Laissez vos seringues préremplies dans leur emballage d'origine afin de les protéger de la lumière jusqu'au moment de les utiliser.
- **Ne réchauffez pas** les seringues préremplies au micro-ondes, **ne faites pas** couler de l'eau chaude dessus et **ne les placez pas** sous la lumière directe du soleil.
- **N'agitez pas** les seringues préremplies.
- Mettez au rebut (jetez) vos seringues préremplies si l'une des conditions ci-dessus n'est pas respectée.
- **Gardez vos seringues préremplies et tous vos médicaments hors de la vue et de la portée des enfants.**

Lisez les renseignements sur le médicament destinés aux patients contenus dans cette boîte pour en savoir davantage sur OMVOH.

Eli Lilly Canada Inc., C.P. 73, Toronto (Ontario) M5X 1B1.

OMVOH est une marque de commerce d'Eli Lilly and Company.

© 2023, Eli Lilly and Company. Tous droits réservés.

Date de publication du document : 2023 juillet 20

OMV-0001-PFS-IFU-20230720